



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ**

пл. Ленина, д. 1, г. Орёл, 302021  
телефон 59-85-20, факс 59-85-21  
e-mail: pr\_omp@adm.orel.ru

Руководителям муниципальных органов  
управления образованием

Руководителям подведомственных  
учреждений

1.09.2016г. № 1211

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

В соответствии с письмом управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области от 26 августа 2016 года № 2589д направляем Вам для проведения санитарно-просветительской работы «Памятку для родителей по вакцинации против гриппа».

Необходимо распечатать достаточное количество экземпляров и поместить памятку в образовательных организациях (школы, детские сады, интернаты и др.)

Медицинским работникам организаций необходимо владеть информацией в соответствии с Инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения Гриппол-плюс для компетентных ответов на вопросы населения

Приложение на: 1 л. в 1 экз.

Начальник управления

И. В. Проваленкова

## **Информация для родителей**

**В эпидсезоне 2015-2016 годов при заболевании ОРВИ или гриппом у привитых (и детей, и взрослых) не было тяжелых форм и летальных исходов.**

Вакцинация детей против гриппа в сезоне 2016 года будет осуществляться вакцинами, которые содержат частицы эпидемически значимых штаммов вирусов гриппа.

**Состав вакцины меняется ежегодно в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения на текущий эпидемический сезон гриппа.**

Вакцина предназначена для специфической профилактики гриппа у детей с 6 месяцев, **не содержит консервантов.** Содержащийся в составе полиоксидоний положительно влияет на иммунный статус, повышает устойчивость организма к другим инфекциям.

Вакцина вводится в область дельтовидной мышцы (в плечо). **Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев.** В день прививки проводится осмотр врача (фельдшера) с измерением температуры.

Дети относятся к лицам с высоким риском возникновения осложнений в случае заболевания гриппом. **Вовремя проведенная вакцинация обеспечивает защиту от осложнений (пневмонии, энцефалита и др.).** Вакцинацию проводят ежегодно в осенне-зимний период (лучшее время - сентябрь). Детям в возрасте от 6 до 35 мес включительно вводят по 0.25 мл двукратно с интервалом 3-4 недели. Детям старше 36 мес и взрослым вакцину вводят однократно в дозе 0.5 мл.

Вакцина является высокоочищенным препаратом. Местные и общие реакции, как правило, отсутствуют. Редко в области введения могут развиваться реакции в виде болезненности, отека, покраснения кожи. Также, у отдельных лиц возможны общие реакции в виде недомогания, головной боли, повышения температуры, легкого насморка, боли в горле. Указанные реакции обычно проходят самостоятельно через 1-3 дня. Крайне редко, как и при любой другой вакцинации, могут наблюдаться аллергические реакции, миалгия, невралгия, неврологические расстройства.

**Противопоказана вакцина лицам с аллергической реакцией на куриный белок, в период острых заболеваний (вакцинация после выздоровления).**

Сообщаем также, что в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий (гриппа) осуществляется временный отказ в приеме непривитых детей в образовательные учреждения и оздоровительные учреждения без выдачи листка нетрудоспособности.

Дополнительную информацию по вакцинации Вы можете получить у медицинской сестры образовательного учреждения, врача-педиатра или фельдшера.